

بسمه تعالی

وزارت راه و شهر سازی





سازمان هواشناسی کشور

مدیریت شبکه پایش هواشناسی

خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی (هفته هفتم سال زراعی ۹۵-۹۶)

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و دوم مهر ماه سال جاری ۱۲,۶ میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۵۸,۲ میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری ۲۱,۷ درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۱,۲ میلیمتر بوده است که بارش سال جاری ۵۹,۶ درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته هفتم متعلق به منطقه مینو دشت استان گلستان به میزان ۷۸,۰ میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان ۳۵,۹ درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه سراب استان آذربایجان شرقی به میزان منفی ۳,۸ درجه سلسیوس بوده است.



پیش بینی وضع هوا (از تاریخ ۹۵/۰۸/۲۲ لغایت ۹۵/۰۲/۲۸)

بارش:

چهارشنبه تا دوشنبه هفته آینده: بارش در سطح کشور پیش بینی نمی شود.

دما: پنجشنبه: افزایش ۲ تا ۴ درجه در غرب و جنوب غرب کشور. جمعه و شنبه: افزایش ۲ تا ۵ درجه در سواحل شمالی، افزایش یک تا ۳ درجه در شمال شرق و شرق کشور. یکشنبه: کاهش ۲ تا ۴ درجه در شمال غرب و غرب کشور.

جدول وضعیت رشد محصولات در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی طی هفته گذشته

نام ایستگاه	نام محصول	وارینه	مرحله فیتولوژی	آفات و بیماریها	میانگین دمای خاک (درجه سلسیوس)						مجموع واحد حرارتی (درجه روز)						رطوبت خاک (%) حجمی / وزنی					
					۵	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۱۰۰	۰	۵	۱۰	۱۵	۵	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۱۰۰		
زرقان	-	-	-	-	۱۸.۱	۱۸.۷	۱۸.۸	۱۹.۰	۲۰.۷	۲۲.۲	۹۸.۷	۶۳.۷	۲۹.۲	۶.۰	-	-	-	-	-	-	-	
آمل	باقلا	اسفناپی	پنجه زنی	-	۱۴.۷	۱۵.۱	۱۵.۵	۱۶.۱	۱۷.۸	۲۰.۴	۹۶.۷	۵۹.۷	۲۴.۷	۰.۰	۳۲.۰	۲۴.۰	۲۶.۰	۴۰.۰	-	-	-	
اردبیل	گندم	حیدری	چوانه زنی	-	۶.۷	۷.۲	۷.۷	۸.۸	۱۱.۲	۱۴.۳	۶۷.۹	۱۷.۹	۰.۰	۰.۰	۲۲.۲	۲۱.۳	۲۲.۲	۲۳.۲	۲۲.۲	۲۱.۴	۲۱.۴	
اهواز	گندم	چمران	سبز شدن	-	۲۳.۶	۲۳.۶	۲۵.۲	۲۶.۲	۲۷.۵	۲۷.۸	۱۸۸.۲	۱۵۳.۲	۱۱۸.۲	۸۳.۲	-	-	-	-	-	-	-	
اسماعیل آباد فروین	-	-	-	-	۱۰.۶	۱۰.۹	۱۶.۰	۱۶.۴	۱۶.۹	-	۵۴.۰	۱۹.۰	۱.۰	۰.۰	-	۹.۱	۷.۱	۸.۴	۷.۹	-	-	
بسطام	انگور	سرغ فغری	چوبی شدن ساقه	-	۱۷.۰	۱۴.۲	۱۴.۴	۱۵.۰	۱۶.۰	۱۷.۶	۵۵.۸	۲۱.۳	۰.۸	۰.۰	۱۶.۴	۱۴.۳	۱۵.۰	۱۳.۶	-	-	-	
بسطام	گندم	پیشگام	۳ تا ۴ برگی	-	۱۷.۰	۱۴.۲	۱۴.۴	۱۵.۰	۱۶.۰	۱۷.۶	۵۵.۸	۲۱.۳	۰.۸	۰.۰	۱۱.۴	۱۷.۴	۱۷.۰	۱۸.۷	-	-	-	
داراب	پرتقال	واشنگتن ناول	رشد میوه	-	۲۵.۲	۲۴.۷	۲۴.۶	۲۴.۵	۲۵.۶	۲۷.۲	۱۳۴.۱	۹۹.۱	۶۴.۱	۲۹.۱	۱۲.۴	۱۰.۴	-	-	-	-	-	
داراب	ذرت	۷۰۴	رسیدن	-	۲۵.۲	۲۴.۷	۲۴.۶	۲۴.۵	۲۵.۶	۲۷.۲	۱۳۴.۱	۹۹.۱	۶۴.۱	۲۹.۱	۸.۱	۸.۲	۹.۸	۹.۷	۸.۸	-	-	
فرخشهر	کلزا	اکایی	روژت	-	۱۳.۰	۱۳.۰	۱۳.۷	۱۴.۸	۱۶.۲	۱۷.۸	۶۹.۴	۳۴.۴	۴.۹	۰.۰	۱۷.۰	۱۸.۰	۱۷.۰	۱۷.۰	-	-	-	
اکباتان	-	-	-	-	۱۷.۱	۱۷.۰	۱۶.۷	۱۶.۶	۱۷.۴	۱۹.۰	۴۸.۵	۱۸.۵	۰.۷	۰.۰	۶.۵	۶.۴	۵.۶	-	-	-	-	
برازجان	-	-	-	-	۲۶.۹	۲۷.۰	۲۷.۴	۲۸.۸	۳۱.۱	۳۱.۱	۱۷۱.۵	۱۳۶.۵	۱۰۱.۵	۶۶.۵	-	-	-	-	-	-	-	
گلمکان	انگور	کشمشی	ریزش برگ	-	۱۶.۵	۱۶.۵	۱۶.۰	۱۷.۱	۱۹.۳	۱۰۰.۶	۶۵.۶	۳۰.۶	۶.۰	۵.۳	۶.۹	۷.۴	۸.۲	۸.۸	۹.۰	-	-	
قراخیل	پرتقال	محلی	رشد میوه	که داشت	۱۴.۵	۱۴.۷	۱۵.۵	۱۵.۷	۱۷.۱	۱۸.۲	۹۵.۰	۲۶.۰	۲۵.۰	۰.۰	۲۹.۰	۳۰.۰	۳۲.۰	۳۵.۰	۴۶.۰	۴۸.۰	-	
قراخیل	کلزا	ظفر	روژت	-	۱۴.۵	۱۴.۷	۱۵.۵	۱۵.۷	۱۷.۱	۱۸.۲	۹۵.۰	۲۶.۰	۲۵.۰	۰.۰	۲۹.۰	۳۰.۰	۳۲.۰	۳۵.۰	۴۶.۰	۴۸.۰	-	
حاجی آباد	پرتقال	محلی	رشد میوه	-	۲۲.۲	۲۲.۳	۲۴.۲	۲۶.۳	۲۸.۰	۲۷.۳	۱۳۶.۶	۱۰۴.۶	۶۹.۶	۳۴.۶	-	-	-	-	-	-	-	
هاشم آباد	-	-	-	-	۱۵.۹	۱۴.۵	۱۵.۳	۱۷.۲	۱۶.۹	۲۲.۵	۹۲.۳	۵۸.۲	۲۳.۲	۰.۰	-	-	-	-	-	-	-	
چهرم	پرتقال	واشنگتن	رسیدن میوه	-	۲۲.۰	۲۲.۵	۲۳.۰	۲۳.۰	۲۴.۴	۲۲.۶	۱۴۴.۰	۱۰۹.۰	۷۴.۰	۲۹.۰	۱۴.۰	۱۴.۰	۱۵.۰	-	-	-	-	
چهرم	خرما	شاهانی	برداشت	-	۲۲.۰	۲۲.۵	۲۳.۰	۲۳.۰	۲۴.۴	۲۲.۶	۱۴۴.۰	۱۰۹.۰	۷۴.۰	۲۹.۰	۱۴.۰	۱۴.۰	۱۵.۰	-	-	-	-	
کیوترآباد	-	-	-	-	۱۴.۲	۱۴.۷	۱۵.۷	۱۶.۷	۱۸.۷	۲۰.۳	۹۱.۵	۵۶.۵	۲۱.۵	۳.۹	-	-	-	-	-	-	-	
کرج	-	-	-	-	۱۰.۶	۱۱.۳	۱۲.۳	۱۲.۵	۱۷.۰	۱۹.۵	۳۷.۱	۲۷.۱	۵.۸	۰.۰	۸.۰	۱۱.۰	۱۷.۰	۶.۰	۱۴.۰	۱۲.۰	-	
خسرو شاه	گندم	پیشگام	یک تا ۲ برگی	-	۸.۳	۸.۵	۱۱.۲	۱۲.۵	۱۴.۳	۱۷.۳	۶۷.۷	۱۳.۴	۰.۰	۰.۰	۱۷.۲	۲۲.۴	۲۲.۰	۱۹.۶	۱۴.۳	۱۲.۴	-	
میانندآب	آلو	شابلون	ریزش برگ	-	۹.۶	۹.۹	۱۱.۱	۱۱.۸	۱۴.۲	۱۷.۱	۴۵.۰	۱۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۳.۷	۱۱.۵	۱۲.۹	۱۴.۸	۱۵.۸	۱۶.۰	-	
خیرآباد	گندم	پیشگام	یک تا ۲ برگی	-	۷.۶	۷.۶	۸.۶	۱۰.۳	۱۲.۶	۱۵.۶	۴۱.۲	۶.۶	۰.۰	۰.۰	-	-	-	-	-	-	-	
میناب	انبه	محلی	شروع خواب	-	۲۱.۱	۲۰.۹	۲۱.۱	۲۱.۵	۲۲.۳	۲۳.۰	۱۹۲.۸	۱۵۷.۸	۱۲۳.۸	۸۷.۸	-	-	-	-	-	-	-	
میناب	کنار	محلی	گلدی	-	۲۱.۱	۲۰.۹	۲۱.۱	۲۱.۵	۲۲.۳	۲۳.۰	۱۹۲.۸	۱۵۷.۸	۱۲۳.۸	۸۷.۸	-	-	-	-	-	-	-	
میاند جیرفت	خرما	مضافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲.۰	۱۲۷.۰	۹۲.۰	۵۷.۰	-	-	-	-	-	-	-	
میاند جیرفت	پرتقال	والنسپا	رشد میوه	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲.۰	۱۲۷.۰	۹۲.۰	۵۷.۰	۷.۰	۹.۰	۹.۰	۸.۰	۶.۰	-	-	
میاند جیرفت	یونجه	ایران شهری	برداشت	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲.۰	۱۲۷.۰	۹۲.۰	۵۷.۰	۷.۰	۹.۰	۱۰.۰	۹.۰	۸.۰	-	-	
میاند جیرفت	سیب زمینی	سانته	سبز شدن	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۲.۰	۱۲۷.۰	۹۲.۰	۵۷.۰	-	-	-	-	-	-	-	
نازلو ارومیه	سیب	گلدن	ریزش برگ	-	۸.۳	۹.۰	۱۰.۸	۱۲.۵	۱۴.۲	۱۶.۸	۵۱.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۱۵.۸	۱۷.۸	۱۸.۴	۱۹.۶	۱۹.۲	-	-	
نیجف آباد	بادام	شاهرودی	زرد شدن برگ	-	۱۷.۴	۱۸.۲	۱۸.۲	۱۸.۸	۲۱.۱	۲۳.۴	۹۳.۰	۵۸.۰	۲۳.۰	۳.۱	۲.۰	۳.۰	۴.۰	۶.۰	۷.۰	-	-	
نیجف آباد	انگور	عسکری	زرد شدن و ریزش برگ	-	۱۷.۴	۱۸.۲	۱۸.۲	۱۸.۸	۲۱.۱	۲۳.۴	۹۳.۰	۵۸.۰	۲۳.۰	۳.۱	۳.۰	۳.۰	۴.۰	۵.۰	۶.۰	۷.۰	-	
نیشابور	زعفران	ثروت حیدریه	گلدی	-	۱۲.۶	۱۰.۶	۱۳.۴	۱۴.۹	۱۷.۱	۱۹.۷	۶۰.۸	۲۵.۸	۰.۵	۰.۰	۱۹.۳	۱۸.۶	۱۷.۹	۱۸.۱	۱۷.۶	-	-	
نیشابور	گندم	سروان	جوله زدن	-	۱۲.۶	۱۰.۶	۱۳.۴	۱۴.۹	۱۷.۱	۱۹.۷	۶۰.۸	۲۵.۸	۰.۵	۰.۰	۳۲.۱	۲۹.۲	۲۶.۰	۲۳.۱	۲۱.۶	-	-	
اولتان مغان	-	-	-	-	۹.۶	۱۰.۰	۱۳.۵	۱۵.۲	۱۶.۹	۲۰.۲	۷۳.۰	۳۸.۰	۶.۱	۰.۰	-	-	-	-	-	-	-	
رفسنجان	پسته	فندقی	خزان	-	۲۰.۵	۲۰.۲	۲۱.۳	۲۲.۴	۲۴.۳	۲۸.۸	۱۱۱.۲	۷۶.۲	۴۱.۲	۱۰.۷	-	-	-	-	-	-	-	
رشت	-	-	-	-	۱۴.۱	۱۴.۳	۱۴.۹	۱۵.۶	۱۶.۶	۱۸.۱	۸۸.۳	۵۳.۳	۱۸.۳	۰.۰	۲۲.۰	۲۱.۲	۲۲.۰	۲۳.۰	-	-	-	
لاهیجان	چای	هیرید چینی	برداشت	-	۱۳.۹	۱۳.۴	۱۴.۳	۱۵.۱	۱۶.۵	۱۸.۷	۸۶.۶	۵۱.۶	۱۶.۶	۰.۰	۳۱.۲	۳۰.۲	۳۰.۶	۲۹.۲	-	-	-	
منجیل	زیتون	روغنی	برداشت	-	۱۳.۹	۱۳.۵	۱۴.۹	۱۶.۲	۱۷.۹	۲۱.۵	۹۳.۶	۵۸.۶	۲۳.۶	۰.۰	۳۰.۰	۳۰.۲	۲۹.۲	۲۷.۰	-	-	-	
سامان	بادام	شاهرودی	زرد شدن برگ	-	۱۳.۲	۱۳.۵	۱۳.۷	۱۴.۶	۱۵.۸	۱۷.۶	۷۷.۷	۴۲.۷	۱۱.۳	۰.۰	۳.۱	۳.۳	۸.۰	۱۱.۱	۱۵.۸	-	-	
صفی آباد	ذرت	جوین مشهد	خمیری شدن	-	۲۲.۱	۲۲.۴	۲۳.۸	۲۴.۷	۲۶.۴	۲۸.۳	۱۳۶.۶	۱۰۱.۶	۶۶.۶	۳۱.۶	۱۸.۱	۱۹.۰	۱۹.۱	۱۸.۹	۱۸.۰	-	-	
سرآبله	-	-	-	-	۱۹.۰	۱۸.۴	۱۹.۷	۲۰.۷	۲۲.۳	۲۳.۸	۹۹.۵	۶۴.۵	۲۹.۵	۱.۳	۴.۰	۵.۰	۵.۰	۵.۰	۶.۰	-	-	
سرآرود	-	-	-	-	۱۴.۴	۱۴.۶	۱۵.۹	۱۷.۴	۱۹.۵	۲۲.۵	۷۸.۰	۴۲.۰	۹.۰	۰.۰	-	-	-	-	-	-	-	
سیلاخور	-	-	-	-	۱۷.۰	۱۷.۰	۱۵.۲	۱۶.۴	۱۸.۹	۲۱.۶	۷۵.۶	۴۰.۶	۸.۲	۰.۰	-	-	-	-	-	-	-	
طرق	زعفران	ثروت حیدریه	-	-	۱۲.۹	۱۳.۵	۱۵.۴	۱۵.۸	۱۷.۵	۱۹.۸	۷۸.۱	۴۲.۱	۹.۳	۰.۰	۴.۲	۹.۳	۱۲.۲	۱۳.۶	۱۴.۱	۱۴.۵	-	
طرق	زرد آلو	شاهرودی	-	-	۱۲.۹	۱۳.۵	۱۵.۴	۱۵.۸	۱۷.۵	۱۹.۸	۷۸.۱	۴۲.۱	۹.۳	۰.۰	۴.۲	۹.۳	۱۲.۲	۱۳.۶	۱۴.۱	۱۴.۵	-	
زهک	-	-	-	-	۱۹.۰	۱۹.۹	۲۱.۴	۲۲.۳	۲۳.۸	۲۵.۳	۱۳۲.۷	۹۷.۷	۶۲.۷	۲۷.۷	۳.۰	۳.۰	۴.۰	۵.۰	۷.۰	۸.۰	-	

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۰۸/۲۰ لغایت ۹۵/۰۸/۲۶)

- استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:
- باغبانی:
 - انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع می باشد.
 - تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
 - تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی (پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندارد زراعی
 - تسریع در برداشت محصولات باغی (سیب - انگورو...) و انتقال به انبار
 - تسریع در جمع آوری و عرضه سیب صنعتی (زیردرختی) در جعبه های پلاستیکی با رعایت مسایل بهداشتی
 - تمهیدات لازم جهت استفاده از فروت ست در باغات در ساعات میانی روز
 - استفاده از قارچ کش ها پس از برداشت میوه در باغات
 - کارتن بندی دور تنه و شاخه های اصلی درختان میوه
 - از بین بردن بقایای مزارع گوجه فرنگی و شخم عمیق در این مزارع جهت از بین بردن جمعیت زمستان گذران آفت مینوز
 - ادامه برداشت محصول انار در طارم
 - کشت محصول سیر و باقلا در طارم
 - تسریع در ردیابی و مبارزه با مگس زیتون با استفاده از تله های فرمونی و کارت زرد در باغات زیتون
 - مبارزه با علفهای هرز باغات میوه
- زراعی:
 - تسریع در اجرای عملیات خاکورزی و آماده سازی بستر و کشت زراعت های پاییزه آبی و دیم (گندم و جو)
 - تسریع در برداشت ذرت علوفه ای و انتقال به سیلو
 - برداشت چغندر قند و انتقال به انبارهای استاندارد
 - تسریع در کاشت زراعت های پاییزه آبی و دیم (گندم و جو) و نخود
 - مبارزه با علفهای هرز در مزارع کلزا
- دام داری:
 - تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی
 - جلوگیری از نقل و انتقال دام ها در جهت کنترل بیماری تب برفکی
- زنبورداری:
 - درزگیری و ایزولاسیون کندوها و انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
 - محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمائی بویژه در صبح هنگام
- ماشین آلات:
 - اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها
- استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
- باغبانی:
 - انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع می باشد.
 - تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
 - محلول پاشی باغات میوه برداشت شده به وسیله کود فروت ست تا قبل از زرد شدن و خزان برگ ها در ساعات میانی روز
 - استفاده از کودهای ریز مغذی در باغات میوه با استفاده از نتایج آزمون خاک و برگ و طبق توصیه های کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی
 - برداشت محصولات باقیمانده در باغات توسط باغداران

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنامه هفته هفتم سال زراعی ۹۶-۹۵

- با توجه به کاهش دما تسریع در برداشت مزارع سیب زمینی باقیمانده و انتقال سریع به انبارهای مناسب زراعی:
- در زراعت گندم دیم ضمن رعایت تناوب زراعی از محصولاتی مثل نخود، عدس و ماشک علوفه ای استفاده شده و از کشت متوالی گندم اکیدا "خودداری گردد."
- مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعت های آبی
- انجام آبیاری به منظور شروع فرآیند پنجه زنی و شکستن سله های احتمالی در زراعت کلزا
- اجرای زراعت کلزا دیم در نقاط گرم
- انجام کشت مکانیزه گندم و جو با استفاده از دستگاههای عمیقکار وردیفکار با رعایت میزان بذر جهت ایجاد تراکم مناسب کاشت
- تهیه بذور گندم وجو اصلاح شده و گواهی شده و ضد عفونی بذور با سموم قارچکش علیه بیماری سیاهک
- تسریع در کاشت غلات در مناطق معتدل و سرد
- آبیاری مزارع زعفران تازه کشت شده
- دام داری:
- تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی
- زنبورداری:
- تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی
- محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمائی بویژه در صبح هنگام
- استان های گیلان و مازندران:
- باغبانی:
- انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع می باشد.
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- برداشت میوه های خرمالو و نارنگی های پیش رس و انشو و انتقال به انبارهای استاندارد
- برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی (پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و انتقال به انبارهای استاندارد
- احداث زهکش به عمق مناسب در باغات (مرکبات) متناسب با شیب زمین
- استفاده از قیم های مناسب و کافی در باغ های بارده
- کنترل مگس میوه باغات نارنگی و خرمالو
- کنترل آفت حلزون در باغ ها و مزارع، کلزا و سبزیجات
- کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع کلزا
- زراعی:
- برداشت از مزارع پنبه ، لوبیا سبز، سویا و انواع سبزی ها
- کاشت کلزا، سبزی های برگی، سیر و باقلا
- برداشت مزارع برنج رتون و کشت مجدد رسیده
- مصرف کود سرک (اوره) در مزارع کلزا
- شیلات:
- تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی
- اطمینان از عملکرد ژنراتور برق اضطراری
- رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها
- مبارزه با انگل لرنا با سم « تری کلروفون » در ماهیان گرم آبی
- کاهش میزان غذادهی (به مقدار ۱۰ درصد) در ماهیان گرم آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی
- دام و طیور:
- تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی
- مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده
- گرم کردن سالن های پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجه ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن ها خصوصاً کف آنها
- اطمینان از عملکرد سیستم گرمایشی قبل از جوجه ریزی
- زنبورداری:

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنامه هفته هفتم سال زراعی ۹۶-۹۵

- درزگیری و ایزولاسیون کندوها و انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
- محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی به ویژه در صبح هنگام
- **استان گلستان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- احداث و ترمیم تشک های پای درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک
- باغداران محترم نسبت به امحاء محصول مرکبات آلوده به مگس زیتون در کف باغات ریزش نموده اند، اقدام نمایند.
- **زراعی:**
- برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی (پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) و محصولات باغی و انتقال به انبارهای استاندارد زراعی
- تسریع در برداشت ذرت علوفه ای و انتقال به سیلو و جمع آوری وش
- آماده سازی زمین و کشت به موقع جو، تریکاله و یونجه و کلزا
- برداشت سویا با توجه به وجود جو پایدار و انبار نمودن آنها در انبارهای مسقف
- تسریع در برداشت پنبه با توجه به وجود جو پایدار
- **حفظ نباتات:**
- کشاورزان گرامی قبل از کشت کلزا جهت کنترل آفت کک حتما نسبت به ضدعفونی بذور کلزا با سموم توصیه شده توسط حفظ نباتات اقدام نمایند.
- کشاورزان گرامی که قصد کاشت کلزا دارند، جهت کنترل علفهای هرز نسبت به استفاده از علفکشهای پیش از کاشت طبق توصیه کارشناسان حفظ نباتات اقدام نمایند.
- **دام داری:**
- تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی
- **زنبورداری:**
- درزگیری و ایزولاسیون کندوها و انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
- محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی بویژه در صبح هنگام
- **استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:**
- **باغبانی:**
- انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع می باشد.
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- برداشت محصولات باغی مانند انار و خرمالو و انگور
- احداث تله های چالکودی با توجه به کاهش دمای سطح خاک و حرکت لاروهای کرم سفید ریشه به اعماق خاک
- حذف علفهای هرز ریزوم دار در باغات و مزارع
- **زراعی:**
- شخم اراضی در زمین های آیشی که علف های هرز رشد کرده اند (پس از مناسب شدن رطوبت خاک)
- تسریع در برداشت ذرت
- بهترین زمان برای مبارزه با علف های هرز و جوندگان و از بین بردن کانون های زمستانگذرانی آنها
- آماده سازی اراضی کشاورزی و کشت غلات و کلزای پاییزه
- **دام داری:**
- تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی
- **زنبورداری:**
- درزگیری و ایزولاسیون کندوها و انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
- محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمایی بویژه در صبح هنگام

- ماشین آلات:
- استفاده از ضد یخ در ماشین آلات کشاورزی
- **استان های اصفهان و یزد :**
- **باغبانی:**
- انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع می باشد.
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- تعجیل در برداشت سیب زمینی در مناطق سردسیر استان اصفهان
- آبیاری و کوددهی با کود های سرک در باغات پسته برداشت شده جهت افزایش کمی و کیفی محصول سال بعد و تقویت جوانه های زایشی پسته
- انجام عملیات داشت پس از برداشت باغات پسته مانند مبارزه با آفت های احتمالی و کاربرد کود سرک نیترات آمونیوم به همراه آبیاری جهت تقویت درختان
- تنظیم رطوبت در باغ و حفظ علف های هرز کف باغ به جز مرغ برای کاهش ترکیدگی انارها
- **زراعی:**
- آماده سازی اولیه زمین کشت غلات
- **دام داری:**
- تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی
- **زنبورداری:**
- درزگیری و ایزولاسیون کندوها و انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق
- محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمائی بویژه در صبح هنگام
- **استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:**
- **باغبانی:**
- انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع می باشد.
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- استفاده از کود فروت ست در باغات برداشت شده در ساعات گرم روز
- برداشت محصولات مزارع سبزی و صیفی مانند پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی
- تسریع در هرس باغات انگور
- **زراعی:**
- برداشت پنبه و چغندر قند
- استفاده از علف کش در مزارع کلزا
- استفاده از بذور گندم ضد عفونی شده جهت جلوگیری از آلودگی به بیماری های سیاهک پنهان و آشکار
- تسریع در کشت گندم و جو
- **دام داری:**
- تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی
- گرم نمودن آغل های نگه داری گوسفندان در شب هنگام
- **زنبورداری:**
- تنگ کردن کندو های زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی
- محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمائی بویژه در صبح هنگام
- **ماشین آلات:**
- اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها
- **استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:**
- **باغبانی:**
- انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع می باشد.

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنامه هفته هفتم سال زراعی ۹۵-۹۶

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- برداشت محصولات باقیمانده خصوصا سیب درختی و انار
- با توجه به تداوم برداشت زرشک تا اوسط آذر ماه، به باغداران توصیه می شود کشت پاجوش زرشک بعد از برداشت محصول در مناطق مستعد در استان کرمان صورت گیرد.
- در باغات پسته هرس پس از برداشت انجام گیرد و چوب های هرس شده بعنوان تله برای سوسک سرشاخه خوار در قسمت هایی از باغ بصورت دسته جات گذاشته شود.
- بارزه با علف های هرز سبب زمینی و پیاز در مناطق جنوبی و گرمسیر
- مبارزه با مگس سفید جهت جلوگیری از انتقال بیماریهای ویروسی
- هرس شاخه های خرما
- **زراعی:**
- برداشت زعفران قبل از طلوع آفتاب جهت بالابردن کیفیت محصول
- تمهیدات لازم و بالخص آبیاری مزارع ذرت جهت جلوگیری از خسارت با توجه به روند کاهشی دما
- **دام داری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- گرم نمودن آغل های نگه داری گوسفندان در شب هنگام
- **استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:**
- **باغبانی:**
- انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع می باشد.
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- **زراعی:**
- آماده سازی اولیه زمین کشت غلات و تاخیر در کاشت غلات بویژه در مناطق جنوبی استان
- برداشت محصولات باغی که به افت دمای هوا حساس هستند
- خود داری از آبیاری سنگین مزارع کلزا کشت شده
- **دام داری و مرغداری:**
- تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژي
- **استان های ایلام و خوزستان:**
- **باغبانی:**
- انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع می باشد.
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- کنترل کلیه عوامل خسارت زا (آفات، بیماریها و علف های هرز)
- آمادگی هرس مرکبات بعد از برداشت و عملیات کود پاشی
- آمادگی کشت کاهو در مزارع
- **زراعی:**
- تعجیل در کشت جو در مناطق جنوبی استان خوزستان
- برداشت یا چرای مزارع یونجه
- تهیه زمین و تهیه بذر کلزا جهت کشت و آمادگی جهت کشت شبدر برسيم
- مزارع پیش کار ذرت با توجه به رطوبت موجود در اولویت برداشت قرار گیرد.
- عملیات کود پاشی مزارع سویا و کلزا
- چغندرکاران محترم مزارع را نسبت به آفات طوقه خوار کارادرینا و پرودنیا و برگخوار آگروتیس پایش و در صورت مشاهده پس از مساعد شدن شرایط جوی نسبت به کنترل عوامل خسارت زا اقدام نمایند.
- **دام داری و مرغداری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها